

Aumentan las Muertes por Cáncer Cervical Debido a Negligencias en su Detección

La Infraestructura de la Calidad

METROLOGÍA

NORMAS

ENSAYOS

CERTIFICACIÓN

ACREDITACIÓN

SISTEMA DE CALIDAD

PROBLEMA Pruebas con resultados erróneos y retraso en el tratamiento de la enfermedad

En 1989 la American Medical Association documentó que, entre el 15 % y el 30 % de las pruebas de detección de cáncer cervical realizadas en Nueva Zelanda, resultaron falsos negativos. Es decir, no detectaron la enfermedad y muchas mujeres desarrollaron el cancer sin saberlo. Las investigaciones posteriores han confrmado que las negligencias cometidas en los análisis condujeron a esta errónea interpretación de los resultados. Esto provocó que no se comenzara el tratamiento, o bien se retrasara demasiado tiempo. Como resultado el número de muertes por esta enfermedad aumentó en los últimos años.

ANTECEDENTES Negligencias cometidas en los análisis

Una de las pruebas utilizadas para la detección del cáncer cervical es el Pap smear. Su uso debería eliminar prácticamente las posibilidades de que una mujer desarrolle el cancer, sin que este sea detectado. De hecho un porcentaje significativo de estas pruebas son mal realizadas y proporcionan resultados erróneos. Esto se debe a negligencias cometidas en los laboratorios de ensayo y a la inexistencia de normas que regulen los métodos de las pruebas y garanticen una verdadera prevención.

SOLUCIÓN Legislación y control de la calidad de las pruebas

La reducción de la aparición de falsos-negativos en la prueba de Pap smear ha sido uno de los principales objetivos de la reforma legislativa y de los programas de control de calidad en todo el país. La solución parte de la mejora en el sistema de calidad de los laboratorios y la elaboración de normas que exijan un nivel de error cero en las pruebas de detección. La existencia de este tipo de normas puede constituirse como el principio para que en la práctica se cometan los mínimos errores y se pueda tratar la enfermedad a tiempo. Como efecto se evita así una parte importante de las 7 000 muertes que se producen cada año por esta enfermedad.

IMPACTO Detección a tiempo de la enfermedad

El cáncer cervical ocupa actualmente uno de los primeros lugares entre las causas de la mortalidad femenina en el mundo, convirtiéndose en una de las grandes luchas de nuestra sociedad. Para su detección y posterior tratamiento, es indispensable un control exhaustivo de la calidad de las pruebas que permitan alcanzar la exactitud y habilidad requerida. Llevar a cabo esta mejora de la calidad supone costos económicos adicionales por la inversión en equipo y personal cualificado, pero a nivel social los beneficios son mucho más importantes. La detección precoz y el tratamiento pueden evitar consecuencias trágicas para la mujer y para el conjunto de la sociedad.

FUENTES

<http://www.malpracticelawfirm.net/cervical-cancer-negligence.html>
<http://www.malpracticelawfirm.net/misread-pap-smear.html>

Aporta soluciones en las áreas

SECTOR AGRÍCOLA

COMERCIO

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

SALUD

SEGURIDAD

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

MEDIO AMBIENTE